

Beredskap för allvarlig allergisk reaktion/anafylaxi vid vaccination

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk reaktion.

- Två injektionspennor EpiPen/Jext/Emerade ska alltid finnas med vid vaccinationstillfällena.
- Vid en eventuell allvarlig allergisk/ anafylaktisk reaktion ska inj. EpiPen/Jext/Emerade ges enligt instruktion.
- Larma alltid ambulans direkt!
- Efter inj. Med EpiPen/Jext/Emerade ge dessutom 2 tabl. Ceterizin 10 mg (=20mg)
- Samt 10 tabl. Betapred 0,5 mg.
- En andra dos EpiPen/Jext/Emerade kan behöva ges efter 5–10 minuter om symtomen inte förbättras, om symtomen förvärras eller återvänder.

[Instruktionsfilm Emerade](#)

[Instruktionsfilm Jext](#)

[EpiPen®, adrenalinpenna, anafylaxi, allergisk chock](#)

Läkemedel som får ges enl. generellt direktiv av sjuksköterska i kommun i överenskommelse med primärvård Örebro län **2023-10-19**, se nedan:

Indikation	Läkemedel	Dosering och maxdos	Anmärkning/ Kontraindikation
Anafylaxi	EpiPen/Jext/Emerade injektionspenna 300 mikrogram	1 penna å 300 mikrogram vid behov	Vid anafylaktisk reaktion Ring samtidigt 112 Vid otillräcklig effekt upprepa injektionen efter ett par minuter
	Cetirizin tablett 10 mg	2 tabletter	2 tabl å 10 mg (=20 mg) ges vid anafylaktisk reaktion
	Betapred tablett 0,5 mg	10 tabletter (tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)	10 tabl å 0,5 mg (=5 mg) ges vid anafylaktisk reaktion

Läkemedel som får ges enligt generellt direktiv av sjuksköterska i kommun i överenskommelse med primärvård Örebro län [Läkemedelshantering - Kommun • Vårdgivare Region Örebro län](#)